



2017 MISE A DISPOSITION des protocoles médicaux du CHU de Rennes : filière obstétricale
Ces protocoles mis à disposition des partenaires du réseau périnatal 35 sont fournis à titre indicatif, ils n'ont pas été validés par la direction du réseau et à ce titre n'engagent pas sa responsabilité. Les textes sont relayés *in extenso*, ils ne peuvent en aucun cas être modifiés ni diffusés hors contexte.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES
Département de Gynécologie Obstétrique et Reproduction Humaine
Professeur P. POULAIN

oooo

CREATION	PROTOCOLE GHR, BLOC, SDC.	MISE A JOUR
Cardio HD	PROPHYLAXIE DE L'ENDOCARDITE INFECTIEUSE	23/4/2007

CARDIOPATHIES A RISQUES...

...nécessitant une antibioprofylaxie de l'endocardite infectieuse (le + svt, avis cardiologue).

• **cardiopathies à haut risque :**

- Prothèses valvulaires,
- Cardiopathies congénitales cyanogènes,
- Antécédent d'endocardite infectieuse.

• **autres cardiopathies à risque :**

- Valvulopathies: insuffisance aortique, insuffisance mitrale, rétrécissement aortique
- Prolapsus de la valve mitrale avec insuffisance mitrale et/ou épaissement valvulaire,
- Bicuspidie aortique,
- Cardiopathies congénitales non cyanogènes, sauf CIA
- Cardiomyopathies obstructives.

2017 MISE A DISPOSITION des protocoles médicaux du CHU de Rennes : filière obstétricale
 Ces protocoles mis à disposition des partenaires du réseau périnatal 35 sont fournis à titre indicatif, ils n'ont pas été validés par la direction du réseau et à ce titre n'engagent pas sa responsabilité. Les textes sont relayés *in extenso*, ils ne peuvent en aucun cas être modifiés ni diffusés hors contexte.

⇒ FAIRE une ANTIBIOPROPHYLAXIE LORS D'INTERVENTIONS
 UROGENITALES ou FEMMES EN W (à partir de la rupture de la poche des eaux).

	Produit	Dans l'heure précédent le geste	Après le geste : 6h plus Tard
Pas d'allergie aux Béta lactamines	Amoxicilline	2g IV (perf 30 min)	1g per os
	puis Gentamicine	1,5 mg/kg IV (perf 30 min) ou IM	pas de deuxième dose
Allergie aux Beta lactamines	Vancomycine	1g IV (perf ≥ 60 min.)	Pas de deuxième dose
	ou Teicoplanine	400 mg IV (directe)	Pas de deuxième dose
	puis Gentamicine	1,5 mg/kgIV (perf 30 min) ou IM	Pas de deuxième dose