



**2017 MISE A DISPOSITION des protocoles médicaux du CHU de Rennes : filière obstétricale**  
Ces protocoles mis à disposition des partenaires du réseau périnatal 35 sont fournis à titre indicatif, ils n'ont pas été validés par la direction du réseau et à ce titre n'engagent pas sa responsabilité. Les textes sont relayés *in extenso*, ils ne peuvent en aucun cas être modifiés ni diffusés hors contexte.

**CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES**  
Département de Gynécologie Obstétrique et Reproduction Humaine

Professeur P. POULAIN

oooo

CREATION	PROTOCOLE GHR, BLOC, SDC	MISE A JOUR
Octobre 2012	<b>NATISPRAY®2012</b>	Novembre 2012

**TRAITEMENT DE L'HYPERTONIE UTERINE**

• **INDICATIONS**

- Hypertonie utérine entraînant une altération du RCF
- Rétention tête dernière sur rétraction du col
- Hypertonie utérine compliquant une version par manœuvre interne sur 2<sup>ème</sup> jumeau
- Difficultés d'extraction du siège en césarienne
- Inversion utérine

• **PROTOCOLE**

- arrêt de l'ocytocine ou retrait du Propess®
- mise en décubitus latéral gauche
- **prévenir l'équipe obstétricale**
- dans le chariot de la salle d'accouchement ou la salle de césarienne, prendre le flacon de **Natispray® 300 µg/dose**
- **amorcer la pompe en pulvérisant dans le vide**
- **administrer en sublingual 1 pulvérisation de Natispray®**
- attendre 2 minutes
- si nécessaire, réitérer une 2<sup>ème</sup> pulvérisation



**2017 MISE A DISPOSITION des protocoles médicaux du CHU de Rennes : filière obstétricale**

Ces protocoles mis à disposition des partenaires du réseau périnatal 35 sont fournis à titre indicatif, ils n'ont pas été validés par la direction du réseau et à ce titre n'engagent pas sa responsabilité. Les textes sont relayés *in extenso*, ils ne peuvent en aucun cas être modifiés ni diffusés hors contexte.

- maximum 3 pulvérisations, si TA stable (jeter le flacon après utilisation et remettre un nouveau flacon dans le chariot d'accouchement, disponible dans la pharmacie)

- effets indésirables :

- hypotension +++ (vasodilatation)
- nausées
- céphalées
- réactions cutanées

• **SURVEILLANCE**

- au dynamap de la tension artérielle : 1 prise / minute pendant 10 minutes
- du relâchement utérin
- du RCF